

《单词百科:LDL-C是什么意思?LDL-C怎么发音?LDL-C的解释和用法》

英语单词LDL-C是什么意思?LDL-C怎么读?LDL-C怎么发音?简答网为您整理了LDL-C的解释、用法、例句、词组等相关学习资料。下面跟小编一起来看看吧!



LDL-C的意思

1、[医][=low density lipoprotein-cholesterol]低密度脂蛋白-胆固醇;

LDL-C的相关词组

- 1、C flat 降C调;
- 2、C clef 中音谱号;
- 3、Hepatitis C [医]丙型肝炎;
- 4、c | C L
- 5、p c (=patrol craft)巡逻舰

- 6、 haemoglobin C 血红蛋白C
- 7、 hepatitis c [医]丙型肝炎;
- 8、 C and W country and western (music) [音乐] 乡村和西部的 (音乐) (美国新流行音乐);
- 9、 C of E Church of England 英国国教;
- 10、 K of C Knights of Columbus 哥伦布爵士;
- 11、 cytochrome C [化] 细胞色素C;
- 12、 i c I see 我知道;
- 13、 IF C 如果C;国际金融公司(International Finance Corporation)', '广州国际金融中心(Guangzhou International Finance Center)

LDL-C的双语例句

1、 Apo E 4 can increase plasma total cholesterol (TC) and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) lev-els , while Apo E 2 decrease them.

Apo E 4等位基因具有升高TC、 LDL - C的作用, Apo E 2等位基因则有降低TC、 LDL- C的作用.

2、 Methods: TC, TG, HDL C, LDL C, blood glucose (BG) and EKG were determined in 906 elderly persons.

方法 采用 标准化 方法测定血清总胆固醇(TC)、 甘油三脂(TG)、 高密度蛋白胆固醇(HDLC)、 低密度脂蛋白胆固醇(LDLC)、 血糖 (BG) 水平,与常规12导联心电图比较分析.

3、 These inflammatory parameters did not further reduced, but hs-CRP reduced further at the end of 8-week therapy.

治疗8周末LDL -C、 TC未 见进一步下降, 但hs-CRP仍有进一步降低.

4、 Results The TC, TG, LDL-C and FBC were decreased and HDL-C increased after therapy.

结果 治疗后血TC、 TG、 LDL -C、 FBC水平明显下降, HDL -C 水平升高.

5、 The common consensus is that lowering low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels prevents atherosclerotic cardiovascular disease.

一般而言,降低 低密度 脂蛋白胆固醇 (LDL -C) 水平可预防动脉粥样硬化性心血管疾病.

6、 Blood LDL-c, apoB increased significantly after peritonitis.

CAPD组 在发生腹膜炎后血ldl-c、 、 apoB较 未发生之前显著增高.

7、 Danshen yin could decrease the level of TC and LDL-c in serum (P & It; 0.05).

丹参饮亦能降低血清TC、 LDL-c的含量 (P & It; 0.05).

8、 Effects on LDL-C and AI, as well as on gene expression of TSG were first reported.

其中,TSG对于LDL -C 和AI的调节作用, 以及对基因表达的影响为首次报道.

9、 LDL-C , age, sex and smoking may be the risk factors of subclinical AS in LADA patients.

LDL -C 、 吸烟 、 性别 、 年龄及HOMA-IR 可能是LADA患者IMT增加的主要影响因素.

10、 For patients whose LDL C reductions were above the median value.

低密度脂蛋白胆固醇降低高于中间值的病人.

11、 There was a postive correlation between plasma FFA and hsCRP.

血浆FFA与 hsCRP水平呈正相关;(3)血浆FFA、 hsCRP、 TG、 LDL-c 水平与大血管病变呈正相关.

12、 Conclusions: Very low LDL-C and normal SBP are associated with the slowest progression of coronary atherosclerosis.

结论: 非常低水平的LDL -C 和正常SBP与较慢的冠状动脉粥样硬化进展相关.

13、 Probucol did not change serum levl of TG, but the serum levels of TC and LDL-C were significantly lowered.

普罗布考对甘油三酯无明显影响 , 但是血清总胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇均明显降低。

14、Of the patients that had low LDL-C concentrations, normal triglyceride and HDL-C levels, 14 percent had an elevated LDL particle number.

参与研究的病人有低低密度脂蛋白胆固醇水平，正常的甘油三酯和高密度脂蛋白胆固醇水平，有14%的患者低密度脂蛋白粒子数升高。

15、However, statins, despite producing marked reductions in LDL-C, are not associated with an increased risk of cancer.

然而，尽管他汀类药物能显著减低低密度脂蛋白，但它与癌症发生率的增高并无内在联系。

16、Multivariate analysis revealed that the drop in LDL-C and increase in HDL-C both independently predicted atheroma regression.

多变量分析显示LDL-C水平的降低以及HDL-C水平的增加各自都能改善动脉粥样硬化。

17、Elevated serum low-density lipoprotein-cholesterol(LDL-C) is a major risk factor for cardiovascular diseases.

血清低密度脂蛋白-胆固醇（LDL-C）升高是心血管疾病的一个重要危险因素。

18、NCEP guidelines which classify CVD risk on the basis of LDL-C level, are helpful in targeting individuals at risk early in life.

成人准则分类心血管疾病危险的基础上，LDL-C水平，有利于针对个人在早期生活中的风险。

以上是简答网为您整理的LDL-C怎么读的相关信息，希望对大家有一定的帮助。查看更多关于LDL-

C的用法、LDL-C的释义、LDL-

C的相关详情请点击：<https://dict.jiandongshicai.cn/LDL-C>